

PAESE	VIRUS	INCIDENZA MEDIA	DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA	DETTAGLI SULLA MALATTIA	INIZIO	META'	FINE		INIZIO	META'	FINE		INIZIO	META'	FINE		INIZIO	META'	FINE		INIZIO	META'	FINE		INIZIO	META'	FINE		INIZIO	META'	FINE												
					OTT	OTT	OTT		NOV	NOV	NOV		DIC	DIC	DIC		GENN	GENN	GENN		FINE	GENN	FEBB	FEBB	FEBB		MARZO	MARZO	MARZO		APRILE	APRILE	APRILE		MAGGIO	MAGGIO	MAGGIO						
Canada	H3N2(Hongkong)	bassa	a macchia di leopardo in tutte le province	benigna o moderata. Alto numero di morti per polmonite primaria o secondaria (superinfezione batterica). Tutte le età si ammaltavano ma in modo particolare i bambini all'età della scuola elementare.									inizio									picco								picco													
USA	H3N2(Honokona)	alta			inizio																	picco																					
EUROPA																																											
Austria	H3N2(Honokona)	bassa	in tutto il paese; la più alta incidenza in Oberoesterreich.																			inizio	picco																				
Belgio	H3N2(Honokona)+influenza B		incidenza alta a Brussels e nella regione																				inizio																				
Bulgaria	H3N2(Honokona)	moderata	epidemia a Sofia e altri parti del paese	generalmente benigna																			inizio																				
Cecoslovacchia	H3N2(Hongkong) + influenza B (a marzo alcuni casi a Praga)	moderata	tutte le regioni	generalmente benigna																			inizio																				
Danimarca	H3N2(Honokona) e casi sporadici di influenza B	bassa	in leggero aumento in alcune regioni																																								
BRD	H3N2(Honokona) e casi sporadici di influenza B			generalmente benigna. Il virus A3N2(Hongkong) era solo uno degli agenti eziologici fra altri virus																																							
Finlandia	H3N2(Honokona) e casi sporadici di influenza B	moderata		generalmente benigna, associazione con adenovirus																																							
Francia	H3N2(Honokona) e casi sporadici di influenza B	da bassa a moderata		da benigna a moderata, mortalità negli anziani																																							
Grecia	H3N2(Honokona)	bassa		generalmente benigna																																							
Ungheria	H3N2(Honokona)	moderata		benigna																																							
Islanda	H3N2(Honokona)	moderata																					inizio																				
Irlanda	H3N2(Honokona)	bassa																																									
Italia	H3N2(Honokona)	bassa	casi sporadici																																								
Olanda	H3N2(Honokona)	alta	epidemia estesa in tutto il paese	da benigna a moderata																																							
Norvegia	H3N2(Honokona)																																										
Polonia	H3N2(Honokona)	alta		generalmente benigna																																							
Portogallo	H3N2(Honokona)	bassa	casi sporadici in molte regioni																																								
Romania	H3N2(Honokona) + B																																										
Spagna (Barcellona e provincia)	H3N2(Honokona)			benigna																																							
Spagna (Provincia Gerona)	H3N2(Honokona)			associata a adenovirus																																							
Svezia	Influenza B		specialmente nel sud aumento dell'incidenza dei casi di influenza B																																								
Svezia	H3N2(Honokona)	moderata	in tutto il paese, eccetto il nord. A Stockholm e Gothenburg il 5-6% della popolazione era affetta	benigna																																							
Svizzera	H3N2(Honokona) - alcuni casi di influenza B	bassa - moderata																																									
Regno Unito	H3N2(Honokona)	bassa - moderata		benigna	inizio																																						
USSR	H3N2(Honokona)	moderata		generalmente benigna																																							
Yugoslavia	H3N2(Honokona)			generalmente benigna																																							
Fonte: Weekly Epidemiological Record																																											
Scarica pdf file di questo spreadsheet																																											